



Femicur®

Capsule

Prospect informativ

Citiți cu atenție prospectul pentru că acesta conține informații importante pentru dumneavoastră. Acest produs este un supliment alimentar.

Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat.

Acest produs este disponibil în farmacii fără prescripție medicală. Cu toate acestea, administrarea

Femicur® Capsule trebuie să fie făcută în mod corespunzător pentru a avea cele mai bune rezultate.

- Nu aruncați aceste instrucțiuni! Este posibil să mai aveți nevoie să le citiți.
- Întrebați farmacistul dumneavoastră dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau sfaturi!
- Contactați medicul dacă simptomele se înrăutățesc sau dacă nu se îmbunătățesc după 90 de zile!

1. Ce este **Femicur® Capsule** și cum se utilizează
2. Înainte de a lua **Femicur® Capsule**
3. Cum se administrează **Femicur® Capsule**
4. Posibile efecte secundare
5. Cum se depozitează **Femicur® Capsule**
6. Alte informații

Femicur® Capsule

Substanța activă: extract uscat de fructe de vitex agnus castus (piperul călugărului)

1 capsulă conține :

4 mg de extract uscat de fructe de vitex agnus castus (7 – 13 :1)

Agent de extracție: ethanol 60% (m/m)

Alte ingrediente :

Sirup de glucoză, lactoză monohidrat, talc, amidon, stearat de magneziu, siliciu coloidal, gelatină, sodium laurilsulfat, apă purificată, agenți de colorare (dioxid de titanu, oxid roșu de fier).

Femicur® Capsule este disponibil în pachete cu 30 capsule.

1. Ce este Femicur® Capsule și cum se utilizează

1.1 Femicur® Capsule este un produs obținut din plante, folosit pentru ameliorarea tulburărilor premenstruale (edeme, labilitate psihică, constipație, dureri de cap), mastodiniei, afecțiunilor dureroase benigne ale sânilor (mastopatie fibrochistică).

1.2 Producător:

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG,
Bahnhofstr. 35, 38259 Salzgitter, Deutschland
Tel: +49 53 41 307-0
Fax: +49 53 41 307-124
e-mail info@schaper-bruemmer.de
Internet www.schaper-bruemmer.com

Importator:

S.C. 3F Plantamed S.R.L.,
Calea Victoriei 103-105,
Sector 1, București,
Tel: 021 316 8931
Fax: 021 312 9580
www.3f.ro

1.3 Femicur® Capsule este folosit pentru reglarea tulburărilor ciclului menstrual, tulburărilor ce apar înaintea menstruației (sindrom premenstrual) și pentru ameliorarea senzației de tensiune dure-roasă a sânilor (mastodinie).

Notă:

Dacă apar modificări palpatorii ale sânilor sau sângeri menstruale anormale, trebuie să consultați un doctor.

2. Înainte de a lua Femicur® Capsule

2.1 Nu vă administrați Femicur® Capsule

- dacă aveți cunoștință de hipersensibilitate (reacție alergică) la fructele de vitex agnus castus sau față de un alt ingredient din compoziția produsului.

- când sunteți diagnosticat cu tumori ale glandei hipofize, tumori maligne ale sânilor.

- în timpul sarcinii și alăptării.

În experimentele pe animale secreția lactată a fost diminuată după administrarea extractului de vitex agnus castus.

2.2 Conducerea autovehiculelor sau folosirea utilajelor:

Nu sunt cunoscute restricții.

2.3 Administrarea Femicur® Capsule împreună cu medicamente:

Informați medicul sau farmacistul dumneavoastră dacă recent ați luat medicamente, inclusiv medicamente fără prescripție medicală.

Există evidențe că poate apărea o diminuare a eficacității produsului dacă în același timp sunteți în tratament cu un antagonist de receptori dopaminergici.

3. Cum se administrează Femicur® Capsule

Întotdeauna **Femicur® Capsule** se administrează exact cum este prezentat în aceste instrucțiuni. Dacă nu sunteți sigură, verificați împreună cu medicul sau farmacistul dumneavoastră.

3.1 Metoda de administrare:

Se administrează oral.

3.2 Doza uzuală (dacă nu este prescris altfel):

Se administrează o capsulă (corespunzătoare la 40 mg produs vegetal) o dată pe zi, nemestecată, împreună cu un pahar cu apă.

Tratamentul trebuie administrat pentru câteva săptămâni (minim trei luni) până când tulburările se ameliorează sau dispar.

3.3 Supradozare

Dacă luați **Femicur® Capsule** mai mult decât este necesar, adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu au fost observate până acum efecte datorită supradozării.

3.4. Dacă uitați să luați Femicur® Capsule

Nu administrați doza dublă dacă ați uitat să luați o tabletă. Continuați să administrați produsul așa cum este prezentat în instrucțiuni sau după cum v-a prescris medicul.

4. Posibile efecte secundare

Ca și alte produse, **Femicur® Capsule** poate cauza efecte secundare, cu toate că aceste efecte secundare nu apar la toate persoanele care folosesc acest produs.

Efectele secundare sunt contabilizate după următoarele rate de frecvență:

foarte dese:

la mai mult de 1 din 10 cazuri

dese:

la mai puțin de 1 din 10,
dar mai mult de 1 din 100 cazuri

medie:

la mai puțin de 1 din 100,
dar mai mult de 1 din 1000 cazuri

rare:

la mai puțin de 1 din 1000,
dar mai mult de 1 din 10,000 cazuri

foarte rare:

la mai puțin de 1 din 10,000 de cazuri,
incluzând cazurile individuale

4.1 Efecte secundare

Piele: foarte rar pot apărea urticarii însoțite de apariția de papule.

Tract gastrointestinal: acest produs conține lactoză; la pacienții sensibili pot apărea probleme gastrointestinale sau efecte laxative.

4.2 Dacă observați apariția altor efecte secundare în afară de cele menționate în acest prospect, informați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

5. Cum se depozitează Femicur® Capsule

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Nu folosiți produsul după data de expirare menționată pe ambalaj.
Nu sunt instrucțiuni speciale pentru depozitare.

Ultima revizuire a acestui prospect: Iunie 2007

6. Alte informații

Notă pentru diabetici: 1 capsulă corespunde la 0,007 BU